

Les mesures indispensables

Pathologie/Événement	Données cliniques	Examens complémentaires	Conduite à tenir concernant le Védolizumab
Infection active	Fièvre, signe d'appel	NFS, CRP, ECBU, coproculture, imagerie	Contre-indication temporaire jusqu'à la résolution de l'infection
Infection chronique latente	Signe d'appel, Contexte anamnestique	NFS, CRP, tests hépatiques, imagerie	Contre-indication temporaire jusqu'à la guérison de l'infection
Abcès anal ou abdominal	Recherche de signe clinique	Imagerie	Contre-indication temporaire jusqu'à la résolution de l'abcès
Tuberculose	Recherche d' antécédent de tuberculose latente ou active chez le patient ou son entourage , et un séjour en zone d'endémie. Vérification de la vaccination BCG	Intra-dermo réaction à la tuberculine ou Quantiféron® (notamment si vaccin BCG) Rx thorax	Contre-indication temporaire - si tuberculose latente, le traitement est possible après au moins 2 semaines de traitement antituberculeux qui doit être poursuivi durant 3 à 6 mois ensuite - si tuberculose active, après guérison et au moins 2 mois de traitement antituberculeux.
Hépatite B	Signe d'appel, Contexte anamnestique	ASAT, ALAT, Sérologie HBV à compléter le cas échéant par l'ADN du VHB	Si Ag Hbs+ : traitement possible sous couverture d'un traitement anti-viral débuté 2 semaines avant le traitement par Védolizumab, maintenu durant toute sa durée et poursuivi 6 mois après son arrêt
HIV	Signe d'appel Contexte anamnestique	Sérologies HIV, Avis de l'infectiologue	Contre-indication relative, à discuter avec l'infectiologue
Leucoencéphalite multifocale à virus JC (aucun cas sous védolizumab décrit à ce jour)	Signe d'appel neurologique Recherche systématique du virus JC latent non recommandée	Examen neurologique, imagerie, ponction lombaire	Contre-indication définitive
Clostridium difficile	Anamnèse (souvent peu contributive)	Coproculture avec recherche de C. difficile et de sa toxine	Contre-indication temporaire jusqu'à la guérison de l'infection
Cancer	Vérifier l'absence de cancer, notamment digestif, les 5 dernières années	Avis de l'oncologue	Contre-indication si cancer évolutif ou récent (moins de 5 ans pour la plupart des cancers) sauf cancer cutané spino- ou baso cellulaire et cancer <i>in situ</i> du col utérin traité.
Grossesse	Recherche de grossesse en cours, évaluer désir de grossesse à court/ moyen terme	βHCG	Contre-indication temporaire
Exposition préalable aux anti-TNFs	Anamnèse		Délai de 30 jours conseillé entre l'arrêt de l'anti-TNF et le traitement par védolizumab

Les mesures recommandées

Pathologie	cliniques	Examens complémentaires	Action à proposer
Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite	Préciser si vaccination réalisée et si le patient est en ordre de rappel.		Réaliser les rappels (possible sous traitement). Le vaccin oral atténué contre la polio (OPV) est contre-indiqué 3 semaines avant le traitement par védolizumab, durant ce traitement et 3 mois après arrêt de ce traitement.
Pneumocoque	Préciser si vaccination.		Vaccination, idéalement avant traitement, possible sous traitement : Prevenar 13 (1 injection) suivie 8 semaines plus tard d'une vaccination par Pneumo 23 (à renouveler tous les 5 ans).
Varicelle/Zona	Préciser si antécédent de varicelle ou de vaccination.	Sérologies	Pas de contre-indication sauf si infection évolutive. Vaccination minimum 3 semaines avant de débuter le védolizumab. La vaccination est contre-indiquée durant ce traitement et durant les 3 mois après son arrêt.
Hépatite C	Recherche infection VHC ou facteur de risque	Sérologies HCV	Pas de contre-indication, surveillance conseillée.
Cytomégalovirus	Rechercher un antécédent d'infection CMV.	Pas de test de détection, sauf si colite sévère. Dans ce contexte, rechercher une colite à CMV par des biopsies coliques si sérologie ou PCR sanguine positive.	Contre-indication temporaire si infection tissulaire.
Virus d'Epstein-Barr	Rechercher un antécédent d'infection EBV.	Sérologies	Contre-indication temporaire si infection cliniquement évolutive.
Grippe saisonnière	Préciser si vaccination annuelle		Proposer une vaccination annuelle (possible sous traitement).
Papilloma Virus Humain (HPV)	Rechercher antécédent dysplasie du col utérin, condylomes.	Examen gynécologique avec frottis cervical.	Pas de contre-indication. Proposer la vaccination chez la jeune femme (possible sous traitement).
Fièvre jaune	Préciser si vaccination fièvre jaune au cours des 10 dernières années ou si voyage en zone d'endémie envisagé.		Vaccination minimum 3 semaines avant de débuter le védolizumab. La vaccination est contre-indiquée durant ce traitement et durant les 3 semaines qui suivent
Pneumocystose	Préciser les immunosupresseurs		Traitement par co trimoxazole si utilisation de 3 immunosupresseurs incluant le védolizumab