

## Groupe d'Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube Digestif



Date [ \_\_ / \_\_ / \_\_ ]

Initiales patient |\_\_|\_\_|/|\_\_|\_\_|

**Indice de Rutgeerts**  
**(À remplir par le médecin lors de l'iléocoloscopie (6-12 mois après le rétablissement de la continuité d'une résection iléocolique))**

Absence de lésions	i,0
Ulcérations iléales aphtoïdes, peu nombreuses ( $\leq 5$ )	i,1
Ulcérations iléales aphtoïdes multiples ( $> 5$ ) au sein d'une muqueuse intercalaire normale  OU  Lésions plus sévères confinées à l'anastomose ( $< 1$ cm de long)	i,2
Ulcérations iléales aphtoïdes diffuses avec muqueuse intercalaire inflammatoire	i,3
Iléite diffuse associée à des - ulcérations larges - nodules - sténose	i,4
<b>Score</b>	__

*Score i,0 ou i,1 : pas de modification thérapeutique  
Score  $\geq i,2$  : indication à un optimisation thérapeutique  
Rutgeerts P. et al. Gastroenterology 1990 ; 99: 956-63.  
Van Assche G et al. J Crohn's Colitis 2010; 4: 63-101.*