

Date : \_\_/\_\_/\_\_

Initiales du patient : \_\_/\_\_

## MAYO-SCORE

### UC-DAI (Ulcerative colitis Disease Activity Index)

(À remplir par le médecin lors de la consultation et de l'endoscopie)

<b>Fréquences des selles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale 0</li> <li>• 1 à 2 selles en plus du nombre habituel 1</li> <li>• 3 à 4 selles en plus du nombre habituel 2</li> <li>• &gt;4 selles en plus du nombre habituel 3</li> </ul>	—
<b>Présence de sang dans les selles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absent 0</li> <li>• &lt;50% des émissions 1</li> <li>• &gt;50% des émissions 2</li> <li>• Sang (sans selles) 3</li> </ul>	—
<b>Appréciation globale de la gravité par le médecin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quiescente 0</li> <li>• Activité légère 1</li> <li>• Activité modérée 2</li> <li>• Maladie sévère 3</li> </ul>	—
<b>Evaluation de la sévérité des lésions endoscopiques (lors d'une rectosigmoidoscopie)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale ou maladie inactive 0</li> <li>• Anomalies légères (érythème, diminution de la trame vasculaire, légère fragilité) 1</li> <li>• Anomalies modérées (érythème franc, disparition de la trame vasculaire, fragilité, érosions) 2</li> <li>• Anomalies sévères (saignement spontané, ulcérations) 3</li> </ul>	—
	<b>Total Score</b>	—

Score &lt;2 : maladie inactive

Score compris entre 3 et 5 : activité faible

Score entre 6 et 10 : activité modérée

Score &gt;11 : activité sévère

Rutgeerts P, et al. N Engl J Med. 2005; 353: 2462-7.

Le Mayo score partiel est la somme des trois premiers items uniquement :

Score ≤1 : rémission

Score compris entre 2 et 4 : activité faible

Score entre 5 et 6 : activité modérée

Score entre 7 et 9 : activité sévère